



SÍNTOMAS NEUROMIELITIS ÓPTICA

Reconoce las señales a tiempo para empezar a tratar en caso de una **Neuromielitis Óptica**

IDENTIFICA LAS SEÑALES



Identificar los síntomas a tiempo es clave para aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso.

Aunque algunos de estos pueden relacionarse a otras patologías, existen síntomas de alarma que no deben ignorarse y que, ante su persistencia, requieren atención médica inmediata.



Cambios en la agudeza visual.



Ceguera.



Cambio en la precepción de colores.



Dolor ocular, unilateral o bilateral.



Síntomas motores.



Síntomas sensitivos.



Pérdida de control de esfínteres.



Hipo.



Nauseas.



Vómitos incoercibles.



Disfunción cerebelosa.

REFERENCIAS

SÍNTOMAS

- ¹Weinshenker BG and Wingerchuk DM. Mayo Clin Proc. 2017;92(4):663–679. 2. Sellner J, et al. Eur J Neurol. 2010;17(8):1019–1032. 3. Zantah M, et al. Case Rep Pulmonol. 2016;2016:1287690. Ferrán, C., Pedemonte, V., Turcatti, E., & González, G. (2019). Neuromielitis óptica [Neuromyelitis optica]. Medicina, 79 Suppl 3, 60–65.
- Contentti, E. C., Leguizamón, F., Machado, P. E. C., & Alonso, R. (2013). Neuromielitis óptica: actualización clínica y terapéutica. Neurología Argentina, 5(4), 259–269. Imágenes tomadas de www.google.com



SÍNTOMAS ENFERMEDAD OCULAR TIROIDEA

Aprende a identificar las señales antes de que sea tarde para tratar la **Enfermedad Ocular Tiroidea**.

IDENTIFICA LAS SEÑALES

Los síntomas de la Enfermedad Ocular Tiroidea (EOT) pueden variar y aparecer y desaparecer. Estos son algunos:

Ojos protuberantes. La EOT puede hacer que los músculos en el ojo y alrededor de él se hinchen y empujen los ojos hacia afuera.

Retracción de los párpados.

Al empujar el ojo hacia delante, los párpados superior e inferior se mueven hacia atrás. Esto hace que se puedan ver más las partes blancas del ojo.

Ojos secos Con la EOT, los ojos quedan más expuestos al viento y al polvo. Esto puede hacer que los ojos se sequen mucho y que la visión sea borrosa.

Cambios en la visión. El crecimiento muscular puede causar visión doble (ver dos imágenes del mismo objeto).

"Bolsas" en los ojos. La hinchazón del párpado puede hacer que sobresalga el tejido que rodea el ojo. Esto se percibe como bolsas alrededor de los ojos y puede hacer que una persona parezca mayor de lo que es.

Los síntomas anteriores por sí solos no son definitivos, además de esto se requiere un **diagnóstico clínico**.

REFERENCIAS

SÍNTOMAS

1 American Academy of Ophtalmopathy
<https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/enfermedad-de-graves>