

PREVENCIÓN LLA

Aunque la LLA no es prevenible puedes conocer algunos factores que **pueden asociarse a un mayor riesgo de padecerla.**

Prevención factores de riesgo ^{6.}

1

Tratamientos previos contra el cáncer:

niños y adultos que se sometieron a ciertos tipos de quimioterapia y radioterapia por otros tipos de cáncer.

2

Exposición a la radiación:

Las personas expuestas a niveles muy altos de radiación tienen mayor riesgo de padecer esta enfermedad.

3

Trastornos genéticos.

Ciertos trastornos genéticos, como el síndrome de Down, están asociados con un mayor riesgo de LLA.

REFERENCIAS

PREVENCIÓN

6.
<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/acute-lymphocytic-leukemia/symptoms-causes/syc-20369077>

PREVENCIÓN TIP

Aunque la TIP no es prevenible **puedes cuidarte de formas secundarias** de Trombocitopenia que confundan o dilaten el diagnóstico.

Prevención individual

No existen medidas preventivas específicas para TIP, ya que es un trastorno autoinmune.

Sin embargo, estas son algunas recomendaciones que, aunque no previenen la Trombocitopenia Inmune Primaria si ayudan a prevenir formas secundarias que confundan el diagnóstico con la TIP antes de llegar al diagnóstico por exclusión.



1

Cuidarse de infecciones virales graves como hepatitis C o VIH, que pueden asociarse con TIP secundaria.



2

Mantener un sistema inmune saludable a través de una buena alimentación.



3

Mantener el esquema de **vacunas al día.**

REFERENCIAS

PREVENCIÓN

1. <https://www.cdc.gov/immu-disorders>